

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

VANGUARD PLUS 5L4	
Acción farmacológica	Inmunológico
Forma Farmacéutica	Polvo liofilizado
Presentación	Frasco de vacuna liofilizada y frasco de diluyente (1 dosis) Estuche con 25 dosis.
Contenido de Principio Activo	Virus Distemper Canino – Cepa N-CDV Adenovirus Canino Tipo 2 – Cepa MANHATTAN Virus Parainfluenza Canino – Cepa NL-CPI-5 Parvovirus Canino – Cepa NL-35-D <i>Leptospira canicola</i> – Cepa C-51 <i>Leptospira grippotyphosa</i> – Cepa MAL 1540 <i>Leptospira icterohaemorrhagiae</i> – Cepa NADL (11403) <i>Leptospira pomona</i> – Cepa T262
Autorización de Reg. S.A.G.	2506-B
Indicaciones	Inmunización activa, como ayuda en la prevención de las enfermedades causadas por el virus del Distemper canino, Adenovirus canino tipo 1, Adenovirus canino tipo 2, virus Parainfluenza canino, Parvovirus canino, <i>Leptospira canicola</i> , <i>Leptospira grippotyphosa</i> , <i>Leptospira icterohaemorrhagiae</i> y <i>Leptospira pomona</i>
Contraindicaciones	No vacunar hembras preñadas ni en lactancia.
Posología y Administración	1mL Administrar 2 dosis, desde las 6 semanas de edad, con un intervalo de 3 semanas. Los perros vacunados con menos de 9 semanas de edad deben recibir 3 dosis, con un intervalo de 3 semanas entre cada dosis, para evitar la potencial interferencia de anticuerpos maternos. Revacunación: Se recomienda revacunación anual con una sola dosis
Especie de Destino	Perro
Periodo de Eficacia y Condiciones de Almacenamiento	18 meses. Mantener refrigerado, entre 2 y 8°C. No congelar. Utilizar inmediatamente una vez reconstituida la vacuna.
Modo de empleo	Vía subcutánea o intramuscular. Rehidratar la vacuna liofilizada con el diluyente mediante método aséptico. Agitar bien antes de usar. Administrar asépticamente.
Condición de venta	Bajo receta Médico Veterinaria