

Mundo caninos

Un gran portafolio de productos para prevenir, detectar y tratar a los perros.

Para disfrutar de una vida larga y saludable, cada perro necesita tanto la protección y cuidados de su tutor como la atención de su médico veterinario.

Es por eso que ofrecemos un amplio abanico de vacunas, productos farmacológicos y de diagnóstico, para ayudar a los médicos veterinarios a mantener a sus pacientes caninos saludables y así entregar más años de amor a los perros junto a sus familias.

A través de la prevención, diagnóstico y tratamiento buscamos ofrecer soluciones que aseguren el bienestar y salud animal, enfocándonos diariamente en la formación continua de médicos veterinarios, con el fin de garantizar la viabilidad de sus negocios y la excelencia en su práctica clínica.



apoquel
oclacitinib

CYTOPOINT

Rabguard^{M.R.}

revolution[®]

Simparica
sarolaner

VANGUARD[®]

vetscan

zoetis

PRODUCTO	TIPO DE PRODUCTO	COMPOSICIÓN	INDICACIONES	POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN	PRESENTACIÓN
REVOLUTION 6%	Endectocida	Cada pipeta contiene Selamectina al 6%.	Para el tratamiento, prevención y el control de las infestaciones de pulgas (<i>Ctenocephalides canis</i> y <i>C.felis</i>), la prevención de la filarías (gusano del corazón (no presente en Chile)) causada por <i>Dirofilaria immitis</i> , el control de las garrapatas (<i>Rhipicephalus sanguineus</i> y <i>Dermacentor variabilis</i> (no presente en Chile)) y el tratamiento y control de los ácaros de las orejas (<i>Otodectes cynotis</i>), las lombrices (<i>Toxocara canis</i> , <i>T.cati</i> y <i>Toxascaris leonina</i>) y la sarna sarcóptica (<i>Sarcoptes scabiei</i>) en perros de 6 sem de vida o mayores.	La dosis general es de 6 mg/Kg de peso cada 30 días. Para el control de garrapatas aplicación el día 1 y 15 y luego cada 30 días.	Envase unitario, de 0,25 mL (6%) hasta 2,5 Kg de peso del perro.
REVOLUTION 12%		Cada pipeta contiene Selamectina al 12%.			Envase unitario, de 0,25 mL para perros entre 2,6 y 5 Kg. de peso; 0,5 mL para perros entre 5,1 y 10 Kgs de peso; 1 mL para perros entre 10,1 y 20 Kg. de peso; y 2 mL para perros entre 20,1 y 40 Kg. de peso.
SIMPARICA	Antiparasitario oral	Sarolaner en comprimidos de 5, 10, 20, 40, 80 y 120 mg	<p>Simparica está indicado para el tratamiento y control de infestaciones por pulgas (<i>Ctenocephalides felis</i>, <i>Ctenocephalides canis</i>) y el tratamiento y control de infestaciones por la garrapata café del perro (<i>Rhipicephalus sanguineus</i>).</p> <p>Simparica está indicado para el tratamiento de la sarna causada por <i>Sarcoptes scabiei</i>.</p> <p>Simparica® puede usarse como parte de una estrategia de tratamiento para el control de la Dermatitis por Pulgas (DAPP).</p>	<p>2 mg de Sarolaner/kg de peso vivo, en dosis única, en perros y cachorros desde 8 semanas de edad y 1,3 kg de peso corporal. Repetir una vez al mes de acuerdo a la situación epidemiológica del lugar.</p> <p>Para el tratamiento de sarna sarcóptica se debe administrar una vez al mes por dos meses consecutivos.</p>	<p>Simparica x1: Caja unitaria con un comprimido . Simparica x3: Caja unitaria con tres comprimidos.</p>



PRODUCTO	TIPO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	FORMA DE USO	PRESENTACIÓN
VetScan Giardia	Test rápido canino de sensibilidad 98.1% y especificidad 99.3%	Prueba específica para la detección cualitativa de antígenos del quiste de Giardia en heces caninas.	Lectura en 10-15 minutos.	Estuche de 10 pruebas
Witness Lepto	Test rápido canino de sensibilidad 98.1% y especificidad 93.5%	Prueba rápida para la detección de anticuerpos IgM de leptospira en sangre entera, suero o plasma de caninos.	Lectura en 10 minutos.	Estuche de 5 pruebas
Witness Parvo	Test rápido canino de sensibilidad 86.3% y especificidad 96.1%	Prueba rápida para la detección de antígenos de todas las cepas de Parvovirus en las heces de caninos.	Lectura en 10 minutos.	Estuche de 5 pruebas





Calendario

Plan sugerido para una correcta prevención de las principales enfermedades y parásitos en perros sanos con **baja inmunidad materna**.

Edad del perro	A partir de 6 semanas	8 semanas	9 semanas	12 semanas	Refuerzo Anual
Octuple / Sextuple	Vanguard® Plus 5/CV-L o Vanguard® Plus 5L4		Vanguard® Plus 5/CV-L o Vanguard® Plus 5L4	Vanguard® Plus 5/CV-L o Vanguard® Plus 5L4	Vanguard® Plus 5/CV-L o Vanguard® Plus 5L4
Tos de las perreras			Vanguard® B Oral		Vanguard® B Oral
Giardiasis canina			Vanguard® Giardia	Vanguard® Giardia	Vanguard® Giardia
Rabia				Rabguard	Rabguard
Desparasitación interna / externa	Revolution®				Una aplicación al mes
Desparasitación externa		Simparica®			Un masticable al mes

* Esta es una sugerencia de un programa de vacunación. Los programas de vacunación están sujetos a modificaciones por parte del Médico Veterinario.

*De acuerdo con guías de vacunación recientes, se recomienda que la última dosis del protocolo inicial de vacunación en cachorros de perros (Óctuple, Séxtuple), sea aplicada desde la semana 16 de vida. Por lo tanto, a criterio del Médico Veterinario, se podrá aplicar una dosis adicional al protocolo de acuerdo a esta recomendación.

*WSAVA guidelines, 2016; AAHA guidelines, 2017

Todo acerca de nuestro portafolio de caninos lo encuentras en:



<https://www.zoetis.cl/productos-y-soluciones/caninos/>

Contacta a nuestros representantes en:



<https://www.zoetis.cl/productos-y-soluciones/caninos/#Contactenos>

PRODUCTO	TIPO DE PRODUCTO	COMPOSICIÓN	INDICACIONES	POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN	PRESENTACIÓN
RABGUARD	Vacuna Inactivada contra la Rabia	Vacuna a Virus Muerto para caninos, felinos y hurones	Caninos sanos de 3 meses de edad o mayores deben recibir una dosis. Un refuerzo debe administrarse un año más tarde. Revacunación anual.	1 mL de aplicación SC e IM para caninos.	Empaques de 1 frasco con 10 dosis. Empaques de 50 frascos con 1 dosis cada uno.
 B ORAL	Inmunológico - Suspensión oral	Bordetella bronchiseptica – Cepa 78-9159	Inmunización activa, como ayuda en la prevención de la Traqueobronquitis Infecciosa Canina o Tos de las perreras.	Dosis única. Administrar desde las 8 semanas de edad. Se recomienda la revacunación anual.	Frasco de vacuna liofilizada y frasco de diluyente (1 dosis). Pipeta aplicadora y frasco de diluyente (1 dosis). Estuche con 25 dosis (frascos o pipetas)
 GIARDIA	Vacuna canina	Giardia lamblia – Cepa S2	Está indicada para desarrollar inmunidad activa contra la giardiasis	Dosis 1mL. Administrar 2 dosis, desde las 8 semanas de edad, con un intervalo de 2 a 4 semanas. Se recomienda la revacunación anual.	Caja con 25 dosis y envase unitario.



Sedación

PRODUCTO	TIPO DE PRODUCTO	COMPOSICIÓN	INDICACIONES	POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN	PRESENTACIÓN
ANTISED	Antagonista α^2 adrenérgico.	Atipamezol Clorhidrato 5 mg/mL	Revertir y eliminar los efectos de sedación y analgesia provocados por fármacos agonistas adrenérgicos α^2 (medetomidina y dexmedetomidina)	Uso estricto IM. Ha sido formulado de tal manera que el volumen de dosis sea el mismo de la Dexmedetomidina Clorhidrato 0,5 mg/mL .	Frasco de 10 mL
DEXDOMITOR	Tranquilizante- Anestésico	Dexmedetomidina clorhidrato 0,5 mg/mL	Sedante con propiedades analgésicas indicado para la contención, sedación y analgesia asociado con los exámenes y procedimientos clínicos, cirugía menor y pre-anestesia.	Uso intravenoso (IV) o intramuscular (IM). Dosis sedativa y analgésica en caninos: 375 mcg/m ² IV o 500 mcg/m ² IM. Dosis pre-anestésica en caninos: 125 mcg/m ² IM o 375 mcg/m ² IM.	Frasco de 10 mL



Tratamiento

OTROS

CATEGORÍA	PRODUCTO	TIPO DE PRODUCTO	COMPOSICIÓN	INDICACIONES	POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN	PRESENTACIÓN
ANTIEMÉTICO	CERENIA	Antiemético	Citrato de maropitant 10mg por mL.	Esta indicado para la prevención y tratamiento del vómito canino de diversos orígenes.	1mg/kg cada 24 horas hasta por 5 días. Inyectable.	Frasco de 20 mL.
ANTIINFLAMATORIO	RIMADYL MASTICABLE	Antiinflamatorio No Esteroidal.	Carprofeno 25mg ó 100 mg. Excipientes csp 1 comp.	Indicado para aliviar el dolor y la inflamación crónica y aguda en caninos. Ha demostrado ser clínicamente efectivo para el alivio de los signos asociados con osteoartritis canina.	En caninos, 2,2 mg/Kg de peso corporal dos veces al día ó 4,4 mg/Kg una vez al día., PO	Caja con 14 tabletas masticables (25 mg) y cajas de 14 y 60 comp. Masticables (100 mg).



PRODUCTO	TIPO DE PRODUCTO	COMPOSICIÓN	INDICACIONES	POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN	PRESENTACIÓN
APOQUEL	Inmunomodulador, inhibidor de Janus quinasa de tipo 1	Oclacitinib maleato	Control del prurito asociado a dermatitis alérgicas y control de dermatitis atópica en perros.	0,4-0,6 mg/kg cada 12 horas por 14 días. Continuar 0,4-0,6 mg/kg cada 24 horas para mantención por un periodo indeterminado	Caja con 2 bilster de 10 comprimidos cada uno. Presentaciones de 3,6mg, 5,4mg y 16mg
CYTOPOINT	Cytopoint® es un líquido estéril, listo para usar, que contiene un anticuerpo monoclonal caninizado (mAb) contra la interleucina-31 (IL-31)	Lokivetmab	Cytopoint® ayuda en la reducción de los signos clínicos asociados con la dermatitis atópica en perros.	Mínimo 2 mg/Kg de peso. Administrar a partir de los 3 Kg de peso y 4 meses de edad. Repetir la administración cada 4 – 6 semanas según necesidad.	CAJA CON 2 VIALES 1 ML C/U Concentraciones: 10, 20, 30 y 40 mg.



PRODUCTO	COMPOSICIÓN	INDICACIONES	POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN	PRESENTACIÓN
	<p>Vacuna de alto título viral que contiene una cepa de bajo número de pasaje de Parvovirus canino. Además, contiene los siguientes componentes antigénicos: Coronavirus; Distemper; Adenovirus tipo 2; Parainfluenza; Leptospira canicola; Leptospira icterohaemorrhagiae</p>	<p>Parvovirus Canina, Coronavirus Canino, Distemper, Hepatitis Infecciosa Canina, Adenovirus tipo 2, Parainfluenza canina, Leptospirosis.</p>	<p>SC o IM. Primera dosis a partir de las 6 sem de edad. Segunda dosis debe ser aplicada a las 9 sem de edad. Tercera dosis a las 12 sem de edad. Revacunación anual con una sola dosis.</p>	<p>Cajas de 25 dosis y envase unitario.</p>
	<p>Cada dosis de Vacuna constituida por un componente viral liofilizado y una fracción líquida de bacterias inactivadas contiene: Componente liofilizado virus vivo modificados de Distemper, Adenovirus tipo 2, Parainfluenza y Parvovirus canino. Componente líquido: Bacterina de Leptospira canicola y L. icterohemorrágica.</p>	<p>Está indicada para desarrollar inmunidad contra las siguientes enfermedades: Distemper, Hepatitis Infecciosa Canina, Adenovirus tipo 2, Parainfluenza Canina, Parvovirus Canina, Leptospirosis (L. canicola y L. icterohemorrágica).</p>	<p>SC o IM. Primera dosis en perros de 6 sem de edad; segunda dosis a las 9 sem de edad, tercera dosis a las 12 sem de edad. Revacunación anual con una sola dosis.</p>	<p>Caja x 25 dosis y envase unitario.</p>



Calendario

Plan sugerido para una correcta prevención de las principales enfermedades y parásitos en perros sanos con buena inmunidad materna.

Edad del perro	A partir de 6 semanas	8 semanas	12 semanas	16 semanas	Refuerzo Anual
Octuple / Sextuple*		Vanguard® Plus 5/CV-L o Vanguard® Plus 5L4	Vanguard® Plus 5/CV-L o Vanguard® Plus 5L4	Vanguard® Plus 5/CV-L o Vanguard® Plus 5L4	Vanguard® Plus 5/CV-L o Vanguard® Plus 5L4
Tos de las perreras		Vanguard® B Oral			Vanguard® B Oral
Giardiasis canina			Vanguard® Giardia	Vanguard® Giardia	Vanguard® Giardia
Rabia				Rabguard	Rabguard®
Desparasitación interna / externa	Revolution®				Una aplicación al mes
Desparasitación externa		Simparica®			Un masticable al mes

* Esta es una sugerencia de un programa de vacunación. Los programas de vacunación están sujetos a modificaciones por parte del Médico Veterinario.


*De acuerdo con guías de vacunación recientes, se recomienda que la última dosis del protocolo inicial de vacunación en cachorros de perros (Óctuple, Séxtuple), sea aplicada desde la semana 16 de vida. Por lo tanto, a criterio del Médico Veterinario, se podrá aplicar una dosis adicional al protocolo de acuerdo a esta recomendación.

*WSAVA guidelines, 2016; AAHA guidelines, 2017

Tratamiento ANTIBIÓTICOS

PRODUCTO	TIPO DE PRODUCTO	COMPOSICIÓN	INDICACIONES	POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN	PRESENTACIÓN
CONVENIA	Antibacteriano, Antibiótico	Cefovecina Sódica 84 mg por mL	Infecciones de la piel, tejidos blandos, tracto urinario (cepas de <i>Staphylococcus intermedius</i> , <i>Streptococcus</i> , <i>Escherichia coli</i> y <i>Proteus mirabilis</i>)	8 mg/kg de peso por vía subcutánea. Dosis única. Repetir a los 14 días de ser necesario.	Frascos multidosis para reconstituir con 10 mL de agua destilada. Frasco reconstituido tiene duración de 28 días.
MASTILAC INYECTABLE	Antibiótico inyectable de Amplio Espectro.	Cada mL contiene: Ácido clavulánico 35 mg; Amoxicilina 140 mg.	Tratamiento de infecciones urinarias, de piel y tejidos blandos.	inyectar vía intramuscular o subcutánea 1 mL cada 20 kg de peso cada 24 hrs por 3 a 5 días.	Frasco de 100 mL
SYNULOX	Antibiótico	Amoxicilina (trihidrato) 200 mg, Clavulanato de Potasio 50 mg. Excipientes csp1comp.	Se encuentra indicado para el tratamiento de infecciones de piel y tejidos blandos, infecciones de las vías respiratorias superiores e inferiores, enfermedades urogenitales.	La dosis recomendada es de 12,5 mg por Kg de peso cada 12 horas. Duración del tratamiento 5-7 días	Caja de 10 tabletas palatables.



PRODUCTO	COMPOSICIÓN	INDICACIONES	POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN	PRESENTACIÓN
<p>5 L4</p>	<p>Polvo liofilizado con el siguiente contenido:</p> <p>Virus Distemper Canino – Cepa N-CDV; Adenovirus Canino Tipo 2 – Cepa MANHATTAN; Virus Parainfluenza Canino – Cepa NL-CPI-5; Parvovirus Canino – Cepa NL-35-D; Leptospira canicola – Cepa C-51; Leptospira grippotyphosa – Cepa MAL 1540; Leptospira icterohaemorrhagiae – Cepa NADL (11403); Leptospira pomona – Cepa T262</p>	<p>Inmunización activa, como ayuda en la prevención de las enfermedades causadas por el virus del Distemper canino, Adenovirus canino tipo 1, Adenovirus canino tipo 2, virus Parainfluenza canino, Parvovirus canino, Leptospira canicola, Leptospira grippotyphosa, Leptospira icterohaemorrhagiae y Leptospira pomona</p>	<p>1mL. Administrar 2 dosis, desde las 6 semanas de edad, con un intervalo de 3 semanas. Los perros vacunados con menos de 9 semanas de edad deben recibir 3 dosis, con un intervalo de 3 semanas entre cada dosis, para evitar la potencial interferencia de anticuerpos maternos.</p> <p>Revacunación: Se recomienda revacunación anual con una sola dosis.</p> <p>Vía subcutánea o intramuscular. Rehidratar la vacuna liofilizada con el diluyente mediante método aséptico. Agitar bien antes de usar. Administrar asépticamente.</p>	<p>Caja x 25 dosis.</p> 
<p>CPV/CV</p>	<p>Vacuna de alto título viral que contiene una cepa de bajo número de pasajes de parvovirus canino. Además, contiene Coronavirus canino como componente antigénico adicional.</p>	<p>Específicamente indicada para inmunizar perros contra la Parvovirus Canina y Coronavirus canina desde las 6 sem de edad.</p>	<p>SC o IM. Perros sanos de 6 semanas de edad o mayores deben recibir 3 dosis, administradas con un intervalo de 3 semanas cada una. Se recomienda la revacunación anual.</p>	<p>Envase unitario.</p> 