PRINCIPALES PARÁSITOS EN FELINOS

EXTERNOS

SARNA NOTOÉDRICA

Notoedres cati

Muy pruriginosa, no estacional y contagiosa.
Comienza en el pabellón auricular, y se extiende a frente, párpados y cuello.

SARNA OTODÉCTICA

Otodectes cynotis

Otitis pruriginosa y contagiosa
Afecta al canal auditivo externo.

PULGAS

Ctenocephalides felis y C. canis

Vectores de transmisión de Dipylidium caninum y Bartonella spp.
Prurito, alopecias, pelos rotos, pápulas y máculas eritematosas con costras.
En Infestaciones graves.

PIOJOS

Felicola subrostratus

Transmisión por contacto directo entre hospedadores y al compartir utensilios.
Intenso prurito: intranquilidad y mal caracter.

GARRAPATAS *

Eficaces vectores de agentes patógenos.
Predilección por las zonas ventrales y las zonas con piel fina, como cara, orejas, axilas, y regiones interdigital, inguinal y perianal.

Enfermedades transmitidas por garrapatas

- Hepatozoonosis
- Bartonellosis
- Borreliosis
- Anaplasmosis
- Coxiellosis
- Tularemia

INTERNOS

Dirofilaria immitis *

Infección transmitida por mosquitos.
Las larvas de Dirofilaria immitisse desarrollan en tejidos subcutáneos, tejidos musculares, ventrículo derecho del corazón, pulmones y arterias asociadas
Provoca insuficiencia cardiaca congestiva y sintomatología asociada.

Toxoplasma gondii

El gato es el hospedador definitivo. Se infecta por la ingestión de quistes tisulares de roedores y pájaros o carne cruda de animales infectados.
Las infecciones de gatitos in utero suelen ser letales.
Los signos clínicos en adultos son raros.

Toxocara cati y *Ancylostoma spp.*

Los huevos son eliminados por las heces, y la transmisión se produce por la ingestión de las larvas que contaminan el ambiente.
Alteraciones gastrointestinales, posible oclusión gastrointestinal (*Toxocara cati*) y presencia de sangre en heces o hematoquecia (*Ancylostoma spp.*).

Dipylidium caninum

La infección se produce por la ingestión de pulgas o piojos infectados.
Signos digestivos: diarrea/estreñimiento, dolor abdominal, pérdida de peso y prurito anal.

* No presentes en Chile